

Traitements sur gazon

Etat au 1,1,2024 toujours se référer au site de l'OFAG

Fongicides	Num.homologation	Matière active	Application	Epoque d'application	Dosage	Délai de vente Délai d'utilisation	distance des points d'eau	Zone tempon des surfaces habitables	Température	Divers
Amistar	W-5481	250 g/l Azoxystrobin	max 3 x par an FRAC C3		1.0 l / ha		6 m			interdit en zone S2
Flint/Tega	W-5994	50% Trifloxystrobin	max 3 x par an Qol		800 g / ha		6 m			
Heritage Flow	W-7365	250 g/l Azoxystrobin	max 3 x par an FRAC C3		1.0 l / ha		6 m			interdit en zone S2
Insignia	W-6964	250 g/l Pyraclostrobin	max 3 x par an		1.25 kg / ha		6 m			
Instrata Elite	W-7278	80.3 g/l Difenconazol + 80.3 g/l Fludioxonil	max 2 x par an	2 semaines d'intervalle	3.0 l / ha		20 m			
Medallion	W-7048	11.7% (125 g/l) Fludioxonil	max 4 x par an (Fludioxonil)	2 semaines d'intervalle	3.0 l / ha		6 m			
Proplant	W-7401	722 g/l Propamocarb-Hydrochlorid			Conc.: 0.15 - 0.25%		6 m			
Switch/Play	W-5218	37.5% Cyprodinil + 25% Fludioxonil	max 2 x par an		1.5 kg / ha		6 m			

Herbicide total	Num.homologation	Matière active	Application	Epoque d'application	Dosage	Délai de vente Délai d'utilisation	distance des points d'eau	Zone tempon des surfaces habitables	Température	Divers
Touchdown Syst. 4	W-6131	396 g / l Glyphosat-Ammonium			5 - 10%		6 m			

Herbicides sélectifs	Num.homologation	Matière active	Application	Epoque d'application	Dosage	Délai de vente Délai d'utilisation	distance des points d'eau	Zone tempon des surfaces habitables	Température	Divers
Proclean Turf N	W-7416-4	MCPA; 2,4-D; Mecoprop-P; Dicamba			75 ml / a		6 m		Jour: 10 - 20° C nuit: min 5° C	Ne marcher sur le gazon qu'avec une chemise à manches longues et un pantalon long jusqu'à la prochaine coupe.
Duplosan KV Combi	W-5164 W-6316	350 g / l Mecoprop-P; 160 g / l 2,4-D			4 l / ha		6 m	20 m	Jour: 10 - 20° C nuit: min 5° C	Ne marcher sur le gazon qu'avec une chemise à manches longues et un pantalon long jusqu'à la prochaine coupe.
Erpax Duo	W-7390	340 g / l MCPA; 30 g / l Dicamba	2 x par an	pas sur un jeune semis	4 l / ha		6 m			
Proclean Turf Duo	W-6157-2	363 g / l MCPA. 29.8 g / l Dicamba			4 l / ha		6 m			
Starane Max	W-7202-1	31.6 %333 g/l [sous forme de 45.5 % de fluroxypyriméthyl (480 g/l)]			0.54 l / ha		3 m			pour renforcer le Proclean Turf Duo

Anti-milletts	Num.homologation	Matière active	Application	Epoque d'application	Dosage	Délai de vente Délai d'utilisation	distance des points d'eau	Zone tempon des surfaces habitables	Température	Divers
Ready Germiplus	W-5286	1.71 % Pendimethalin	Pas d'utilisation dans le jardin familial		100 - 130 kg / ha		6 m			
Puma extra	W-6262 W-6262-3	69 g / l Fenoxaprop-P; 75 g / l Mefenpyr-Diethyl	Pas d'utilisation dans le jardin familial		0.4 - 1.0 l / ha		6 m			
Hirso Maxx	W-6851-1	69 g / l Fenoxaprop-P; 34.5 g / l Cloquintocetmexyl	Pas d'utilisation dans le jardin familial	6 semaines après la levée du semis de gazon	0.4 - 1.0 l / ha		6 m			Ne pas tondre la pelouse pendant 7 à 10 jours après l'application

Anti-mousse	Num.homologation	Matière active	Application	Epoque d'application	Dosage	Délai de vente Délai d'utilisation	distance des points d'eau	Zone tempon des surfaces habitables	Température	Divers
Degrade M		effet physique			01:10		6 m			Pas d'autorisation nécessaire
Sulfate de fer ESPACES VERTS		Fer								Pas d'autorisation nécessaire
Insecticide	Num.homologation	Matière active	Application	Epoque d'application	Dosage	Délai de vente Délai d'utilisation	distance des points d'eau	Zone tempon des surfaces habitables	Température	Divers
Kendo / Karate	W-6098-1 W-6098-2	100 g / l Lambda-Cyhalothrin	Si nécessaire, Répéter 7 jours après	seulement en dehors du vol des abeilles	0.3 l / ha		50 m			
Régulateur de croissance	Num.homologation	Matière active	Application	Epoque d'application	Dosage	Délai de vente Délai d'utilisation	distance des points d'eau	Zone tempon des surfaces habitables	Température	Divers
Primo Maxx II	W-6247 W-7178	121 g / l Trinexapacethyl	max. 16 l / ha par an		0.4 - 2.4 l / ha		6 m		ne pas appliquer en cas de risque de gel	